Application of Chain Rule

* $\frac{d}{dx}(u(x))^n = n\,u^{n-1}(x)\cdot u'(x)$
* $\frac{d}{dx}e^{u(x)} = e^{u(x)}\cdot u'(x)$
* $\frac{d}{dx}\sin u(x) = (\cos u(x))\,u'(x)$

etc.

Example: $\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{v(x)}\right) = \frac{d}{dx}(v(x))^{-1}$

$\left(= \frac{d}{dx}g(v(x)),\ g(v) = v^{-1}\right)$

$= -v^{-2}(x)\cdot v'(x) = \frac{-v'(x)}{v^2(x)}$

Example: $\frac{d}{dx}\sqrt{1+x^2} = \frac{d}{dx}(1+x^2)^{\frac{1}{2}}$

$= \frac{1}{2}(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}\cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

Example: $\frac{d}{dx} e^{e^x}$

$= e^{e^x} \cdot e^x$

Implicit differentiation

Example: Find the tangent and normal lines of $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ at $(\sqrt{2}, \frac{-1}{\sqrt{2}})$

Sol: Method (a) (explicit diff.)

$y^2 = 1 - \frac{x^2}{4}$

$\Rightarrow y = \pm\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}$

take "−"

$\frac{d}{dx}\left(-\sqrt{1-\frac{x^2}{4}}\right) = \frac{d}{dx}\left(-\left(1-\frac{x^2}{4}\right)^{\frac{1}{2}}\right)$

$= \frac{-1}{2}\left(1-\frac{x^2}{4}\right)^{\frac{-1}{2}} \cdot \left(\frac{-x}{2}\right)$

$\therefore$ Slope of tangent

$$= \frac{-1}{2}\left(1-\frac{x^2}{4}\right)^{-\frac{1}{2}}\left(\frac{-x}{2}\right)\Big|_{x=\sqrt{2}}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

tangent: $\left(\frac{y-\frac{1}{\sqrt{2}}}{x-\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}$

normal: $\left(\frac{y-\frac{1}{\sqrt{2}}}{x-\sqrt{2}}\right) = -2$

Method (b): (implicit diff.)

$\frac{x^2}{4}+y^2=1$ implicitly defines a function $y=y(x)$ near $\left(\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

i.e. $\frac{x^2}{4}+y^2(x)=1$

$$\frac{x^2}{4} + y^2(x) = 1 \quad \text{for all } x \text{ near } \sqrt{2}$$

$\xrightarrow{\frac{d}{dx}}$ $\frac{x}{2} + 2y(x)\cdot y'(x) = 0$

Substitute $x \leftarrow \sqrt{2}$, $y(x) \leftarrow \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\Rightarrow y' = \frac{-x}{4y(x)} = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow$ tangent line, normal line.

Example: $\frac{(x+y)^2}{32} + \frac{(x-y)^2}{8} = 1$

implicitly defines $y = y(x)$ near $(3,1)$. find $y'(3)$ and $y''(3)$

Sol: $y'(3)$.

$\frac{d}{dx} \Rightarrow \frac{(x+y)(1+y')}{16} + \frac{(x-y)(1-y')}{4} = 0$

$\overset{(x,y)}{=(3,1)} \Rightarrow \frac{4(1+y')}{16} + \frac{2(1-y')}{4} = 0, \quad y'(3) = 3$

$y''(3)$: $\frac{d}{dx}\left(\frac{(x+y)(1+y')}{16}+\frac{(x-y)(1-y')}{4}=0\right)$

$\Rightarrow \frac{(1+y')(1+y')+(x+y)y''}{16}+\frac{(1-y')(1-y')+(x-y)y''}{4}=0$

Substitute $x=3,\ y(3)=1,\ y'(3)=3$

$\frac{(1+3)^2+(1+3)y''}{16}+\frac{(1-3)^2+(1-3)y''}{4}=0$

$1+1=\frac{y''}{2}-\frac{y''}{4},\quad y''(3)=8$

Example: $x=\tan y,\ \frac{dy}{dx}=?$

$\Rightarrow 1=(\sec^2 y)\cdot\frac{dy}{dx}$

$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\sec^2 y}=\frac{1}{1+x^2}$